

# Hyperhémie pulpaire (pulpite réversible)

## Définition et épidémiologie

- La pulpite réversible ou hyperhémie pulpaire est un stade d'inflammation légère de la pulpe associant une augmentation transitoire du flux sanguin et une sensibilisation nerveuse périphérique due aux molécules pro-inflammatoires.
- Si l'agent causal est supprimé, et si l'inflammation n'a pas franchi le stade de l'irréversibilité, le retour à la normale se fait progressivement.

## Circonstances

La pulpite réversible s'observe à chaque fois que la pulpe est soumise à une agression. Cette dernière peut être de nature très variable :

- bactéries : c'est le cas le plus fréquent ;
- dénudations radiculaires ;
- agressions physiques et/ou chimiques, notamment les douleurs postopératoires après traitement conservateur ou les fêlures.

## Terrain

La pulpite réversible ne présente pas de préférence quant à l'âge, le sexe ou un terrain particulier.

## Signes d'appel

Douleur aiguë déclenchée par :

- le froid ;
- les gestes quotidiens (brossage des dents par exemple) ;
- le sucré.

## Signes cliniques

- Douleurs aiguës, passagères et provoquées (notamment par le froid), jamais spontanées.
- Test au froid positif exacerbé, la sensibilité cesse après l'application du stimulus (fig. 1.1).




Fig. 1.1. Tests diagnostiques de la pulpite réversible.



### *Penser aussi à...*

Pulpite irréversible.

## Premier geste

- Pulpite réversible postopératoire :
  - rassurer le patient ;
  - les douleurs disparaissent dans les 48 heures.
- Pulpite réversible due à une lésion carieuse :
  - anesthésie locale et/ou régionale ;
  - pose d'un champ opératoire étanche ;
  - éviction du tissu carieux avec un excavateur ou une fraise boule montée sur contre-angle bague bleu ;
  - obturation définitive avec mise en place d'un verre ionomère en fond de cavité si celle-ci est proche du tissu pulpaire ;
  - si nécessité de temporisation, mise en place d'un eugénate étanche.

## Prise en charge secondaire

Traitement conservateur définitif, si temporisation lors de la première séance.

## Pronostic

Le pronostic est dans la grande majorité des cas très favorable si le traitement conservateur définitif est correctement mené.